

7,5 CM



J.A Saúde Animal

LONGAMECTINA[®]

PREMIUM 3,5%



USO VETERINÁRIO - INJETÁVEL

Solução de Ivermectina 3,5% injetável para o tratamento e controle de parasitos internos e externos dos bovinos.

FÓRMULA

Cada 100 mL do produto contém:

Ivermectina 3,5 g
Veículo q.s.p. 100,0 mL

INDICAÇÕES

LONGAMECTINA[®] PREMIUM 3,5% é indicada no controle de nematódeos gastrintestinais, bernes, bicheiras (miíases por larvas de *Dermatobia hominis* e *Cochliomyia hominivorax*) e auxiliar no controle de carrapatos de bovinos.

Nematódeos gastrintestinais: *Haemonchus placei* (adultos e imaturos), *Trichostrongylus axei* (adultos e imaturos), *Cooperia punctata* (adultos e imaturos), *Cooperia spatulata* (adultos e imaturos), *Oesophagostomum radiatum* (adultos e imaturos) e *Trichuris discolor* (adultos e imaturos).

Parasitos externos: *Dermatobia hominis* (larvas - berne), *Cochliomyia hominivorax* (larvas - bicheira) e *Boophilus microplus* (adultos e imaturos).

MODO DE USO E DOSAGEM

O produto LONGAMECTINA[®] PREMIUM 3,5% deve ser administrado exclusivamente por via subcutânea, sob a pele solta, na frente ou atrás da escápula (paleta), na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corpóreo, conforme tabela:

Peso (kg)	Dose (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
150 kg	3 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL

1 mL a cada 50 kg

Dosagem equivalente a 700 µg de Ivermectina por kg de massa corpórea.

Utilizar seringa e agulha estéril. Procedimentos assépticos devem ser usados na aplicação. O tratamento pode ser repetido conforme a reinfestação do rebanho, 30 dias após a última administração.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO

- utilize protetor ocular, pois o produto é irritante para os olhos. Em caso de contato com os olhos lave-os imediatamente;
- utilize máscaras cobrindo o nariz e a boca, pois o produto é perigoso se inalado ou aspirado. Caso haja inalação ou aspiração procure local arejado;
- utilize luvas de borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e botas, pois o produto é irritante e/ou absorvível pela pele. Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto;
- não utilize o frasco se apresentar vazamento;
- não desentupa bicos e orifícios de frascos e seringas com a boca;
- não manuseie o produto com as mãos desprotegidas;
- fazer antisepsia prévia no local da administração antes da aplicação;
- não aplique o produto contra o vento;
- não contamine coleções de água de qualquer natureza;
- descartar as embalagens vazias e restos de produtos bem como limpar os recipientes utilizados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente;
- lavar as mãos após o manuseio;
- o medicamento deve ser utilizado sob orientação de um médico veterinário.

15 CM

7,5 CM



J.A Saúde Animal

PRIMEIROS SOCORROS

- retirar a roupa e calçado contaminados. Contactar o médico;
- em caso de contato com a pele, lavar com água abundante durante pelo menos 15 minutos;
- em caso de inalação, levar o indivíduo para o ar livre. Se necessário administrar respiração artificial;
- em caso de ingestão, lavar a boca com água se o indivíduo estiver consciente. Contactar imediatamente o médico.

EFEITOS COLATERAIS

O produto não apresenta reações adversas quando administrado dentro das recomendações indicadas. A Ivermectina possui uma ampla margem de segurança terapêutica para bovinos. A intoxicação ocorre em doses extremamente altas.

CONTRAINDICAÇÕES

O produto não deve ser aplicado por outra via que não seja subcutânea; Não administrar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade às Avermectinas;

Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido;

Não administrar em fêmeas em lactação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A Ivermectina associada ao Clorsulon tem sido utilizada, mostrando maiores vantagens do que preparações de uso restrito para nematódeos ou trematódeos. Porém, por tratar-se de dados encontrados apenas em literatura, não recomendaremos essa associação.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA"

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 122 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semi-confinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 9.771 em 04/12/2013.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú
CRMV-SP 1.938

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 50 mL, 250 mL, 500 mL e 1 L do produto.

"NÃO UTILIZE A EMBALAGEM VAZIA"

"NÃO GUARDE OU APLIQUE JUNTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, MEDICAMENTOS, PRODUTOS DE HIGIENE E DOMÉSTICOS"



Proprietário e Fabricante: **J.A. Saúde Animal**
Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000
Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920
CNPJ: 03.749.465/0001-38
www.jasaudeanimal.com.br



SAC 0800 774 4334

15 CM

103_04